

Preparat do początkowego żywienia niemowląt



Sposób przygotowania



Należy postępować dokładnie zgodnie z instrukcjami dotyczącymi sposobu przygotowania i dozowania. Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie gotowego pokarmu może sprzyjać namnażaniu się niepożądanych bakterii.

1. Zagotuj wodę do temperatury 100°C. Ostudź do temperatury 40-50° C.
2. Wsyp odpowiednią dla danego rodzaju posiłku liczbę płaskich miarek do czystej butelki.
3. Dodaj wodę do butelki. Zakręć butelkę i potrząśnij nią tak długo, aż proszek się rozpuści.
4. Ostudź do temperatury podawania i sprawdź temperaturę podawania poprzez wylanie kilku kropli mieszanki na przegub dłoni.

Dozowanie

Dla prawidłowego zdrowia i samopoczucia dziecka ważne jest, aby nie używać ani zbyt dużo, ani zbyt mało proszku w stosunku do ilości wody. Należy ściśle stosować się do podanego sposobu przygotowania i dozowania. Odmierzając miarki proszku należy pamiętać, aby były one płaskie, a nie czubate. Ponadto w każdym wypadku należy używać miarki dołączonej do opakowania.

Tabela dozowania

| Ilość przegotowanej wody | Liczba płaskich miarek | Ilość gotowej mieszanki |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 90 ml | 3 | 100 ml |
| 120 ml | 4 | 135 ml |
| 150 ml | 5 | 170 ml |
| 180 ml | 6 | 200 ml |
| 210 ml | 7 | 235 ml |